



## การป้องกัน

### สำหรับหน่วยงาน

- ปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยโรงพิษสุนัขบ้า
- โรงพยาบาลควรให้การดูแลผู้ที่ถูกสุนัขกัดตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย



### สำหรับประชาชน

- ป้องกันสุนัขกัดโดยเฉพาะในเด็กอายุ 1-10 ขวบ
- ให้ใช้ค่าต่า 5 บ. อ่าเย้ อย่าเหี้ยบ อย่าหิบ อย่าชุ่ย กับสุนัข หรือแมว รวมถึงอย่าปล่อยให้เด็กอยู่กับสุนัขตามลำพัง
- หลีกเลี่ยงไม่ซ่องเกี๊ยวหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่เลี้ยง
- การเข้าหา เล่นกับสุนัขอย่าทำให้สุนัขเจ็บ หรือไกรช หรือ tok ใจ
- เมื่อถูกสุนัข (สัตว์เลี้ยงถูกด้วงหม่นอื่นๆ) กัด บ้วน ต้องรีบถางแพลง ใส่ยา และกักสุนัขไว้เป็นเวลา 10 วัน ไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาว่า เป็นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่
- พบสุนัขไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือสงสัยว่ามีความประพฤติ แจ้งปศุสัตว์ หรือ อบต./ เทศบาล



### โรคพิษสุนัขบ้า



รักแมว รักหมา

หากันไปฉีดยาพิษสุนัขบ้า

รักบ้าน รักชุมชน ไม่สนับสนุนสุนัขจรจัด

ด้วยความปรารถนาดีจาก  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรอม  
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

## การระบาด

โรคนี้เกิดจาก เชื้อไวรัส Rabies ซึ่งมีแหล่งรกรอยได้แก่ สัตว์เลี้ยงสุกี้ดูบ年第ที่สำคัญได้แก่ สุนัข พนว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทยติดเชื้อจากการถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดป่วนรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าพบผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาเป็นภาคใต้ พนได้ทุกเพศ ทุกวัย

## กลุ่มเสี่ยง

- คนที่ชอบเลี้ยงสุนัขหรือเด่นกับสุนัขที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน
- คนที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด แล้วสัตว์ที่กัดตายใน 10 วันหลังกัด หรือสัตว์ที่กัดมีประวัติกัดคนหรือสัตว์อื่นด้วยในเวลาไม่เลี้ยงกัน
- เด็กอายุ 1-10 ปี เสี่ยงต่อการถูกสุนัขกัดและไม่ได้บูผู้ปักครอง

## พื้นที่เสี่ยง

### ได้แก่พื้นที่ที่มีลักษณะต่อไปนี้

- มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษพิษสุนัขบ้าในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
- ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
- มีคนถูกสุนัขกัดจำนวนมาก
- สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่ำกว่าร้อยละ 70
- มีจำนวนสุนัขจรจัดอยู่หนาแน่น



## อาการ

### อาการของโรคในคน

#### จำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ

- แบบคลุ่มคลั่ง ต้องมีอาการครบ 3 ประการ คือ
  - 1.1 อาการสับเปลี่ยนระหว่างภาวะการณ์วุ่นวายเป็นปกติ และไม่วุ่นวายตื่นเต้น กระวนกระวายต่อสิ่งเร้า
  - 1.2 อาการกลัวน้ำ หรือกลัวลม
  - 1.3 ขนลุก รูม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง และมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อนแพ้ภูมิแพ้ภูมิทั่วแขน ขา
- แบบอัมพาต หรือแขน ขาอ่อนแรง เมื่ออาการมากขึ้น จะหายใจไม่สะดวก หมดความรู้สึก และเสียชีวิตในที่สุด
- แบบอาการไม่ชัดเจน